

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КЪМ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ № 0022-1217**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

DIASIP

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активни субстанции:

Diazinon	25 g
α -Cypermethrin	1.5 g

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Емулсия за поливане.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Говеда и овце.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Лечение и контрол на инвазии с кърлежи (*Boophilus*, *Amblyomma*), бълхи (*Haematobia* spp., *Stomoxys*, *Musca*, *Hydrotaea*), крастни кърлежи (*Sarcoptes*, *Psoroptes*, *Chorioptes*) и въшки (*Linognathus* spp., *Haematopinus* spp., *Damalinea* spp.).

4.3 Противопоказания

Няма

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните
Да се избягва контакт с очите, кожата и мукозите. При контакт, да се измият незабавно с обилно количество вода.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, маска и подходящи дрехи, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Да се измият лицето и ръцете с обилно количество вода и сапун.
Да не се яде, пие или пуши при работа с продукта.
Да се съхранява далеч от храна, напитки и хранителни добавки.
Да се използва в добре вентилирани помещения. Да не се вдишват изпаренията.
Празните контейнери да не се използват повторно.

4.6. Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Предполагаемите неблагоприятни реакции могат да бъдат алергични реакции на кожата.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Диазинонът е съвместим с повечето пестициди, но е несъвместим с алкални компоненти и пестициди, съдържащи мед.

4.9 Доза и начин на приложение

За локално приложение чрез поливане или изкърпване чрез потапяне.

Говеда: да се разтвори 1 L в 700 L вода.

Овце: да се разтвори 1 L в 350 L вода.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

- При предозиране могат да се проявят брадикардия, тахипнея, миоза, хипергликемия, хипотензия, централна депресия.
- При случайно отравяне при кожно излагане, да се измие засегнатото място с обилно количество вода и сапун.
- При случайно поглъщане на голямо количество, може да се наблюдават превъзбуждане и конвулсии, водещи до парализа и мускулна фибриляция. Може да се наблюдава и смърт поради белодробна недостатъчност.

Лечение след поглъщане не е необходимо. Може да се приложат солни очистителни и активен въглен. В случай на нервни симптоми, да се използва пентобарбитал, като антидот.

4.11 Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: 7 дни.

Мляко: 7 дни.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

5.1 Фармакодинамични свойства

Диазинонът е широкоспектърен, органофосфорен инсектицид, притежаващ токсичност към бозайниците.

Диазинонът действа като ектопаразитицид при контакт, поглъщане и инхалация.

Като органофосфорен инсектицид, диазинонът инхибира ектопаразитната холинестеразна активност, ензим, широко разпространен в нервите, мускулите, течностите и кръвните компоненти, като контролира невротрансмисията и синапсите, унищожава ацетилхолин невротрансмитерите, отговорни за мускулните контракции.

Резултатът от натрупването на ацетилхолин е блокиране на нервните импулси, водещо до ектопаразитна имобилизация и смърт.

Алфа-циперметринът е контактен ектопаразитицид, принадлежащ към Тип II пиретроидна група, които съдържат α -циано група в молекулата си.

Тип II пиретроидите действат основно на натриевите канали в нервните мембрани, причинявайки продължително удължаване на временното увеличение на натриевия пермембилитет на мембраните по време на възбуждане. Продължителната промяна в натриевите канали води до деполяризация на мембраната и блокиране на потенциала на действие без повтаряща се пресинапсна активност.

Възможно е механизма на действие на тип II пиретроидите да включва действие на GABA рецепторния комплекс.

Активен е срещу: *Кърлежи: *Dermanyssus gallinae*; *Бълхи: *Haematobia irritans*, *Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea irritans*; * Въшки: *Lignonatus spp.* и *Haematopinus spp.*

5.2 Фармакокинетични особености

Синтетичните пиретроиди основно се метаболизират при бозайниците чрез естерна хидролиза, окисление и конюгация и няма тенденция за акумулиране в тъканите.

Диазинонът слабо се резорбира след локално приложение, като най-високи концентрации се достигат в бърбреците и мазнината на гърба.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Emulgent 3720	3 g
Xylol до	100 ml

6.2 Основни несъвместимости

Диазинонът е съвместим с повечето пестициди, но е несъвместим с алкални компоненти и пестициди, съдържащи мед.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

Срок на годност след разтваряне, в съответствие с инструкциите: да се използва незабавно.

6.4 Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се пази в оригиналния контейнер плътно затворен.

Да се съхранява далеч от хора, животни, храна и ветеринарномедицински продукти.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Полиетиленови бутилки от 286 ml и 1 L

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

„ФАРМА СИС БГ” ООД
гр. Добрич, ул. Сан Стефано № 6б, ет.1, офис 3
България

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-1217

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Дата на първото издаване на разрешението за търговия: 25/08/2009

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

17/08/2018

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

