

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ, КЪМ ЛИЦЕНЗ
ЗА УПОТРЕБА № 0022-1954-27.02.2013**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ВУТОХ 50

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

Deltamethrin 5 g/100 ml

Експципенти:

Aromatic solvent q.s.

За пълния списък на експципентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Концентрат за разтвор за кожа за къпане и напръскване.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Говеда и овце.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За профилактика и лечение на ектопаразитни инвазии при говеда и овце, причинени от следните паразити: крастни кърлежи, въшки, кърлежи и мухи.

4.3 Противопоказания

Няма.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП >

Няма.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Не пръскайте срещу вятъра.

Не яжте, не пийте и не пушете по време на прилагането на продукта.

В случай, че продуктът попадне в очите или върху кожата, незабавно измийте с вода.

В случай на поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Носете предпазни ръкавици, когато прилагате продукта и при контакт със скоро третирани животни.

Ако работното облекло е замърсено силно, съблечете го и го изперете преди повторна употреба.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са известни.

4.7 Употреба по време на бременности и лактация

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Някои фосфорорганични инсектициди могат да забавят метаболизма и по този начин да повишат токсичността на делтаметрина. Поради това избягвайте съвместната употреба на продукта с фосфорорганични инсектициди.

4.9 Доза и начин на приложение

Чрез къпане или напръскване.

Само за външна употреба!

Показания	Количество Butox 50, необходимо за 100 л вода		
	Приложение чрез напръскване	Приложение чрез къпане	
		първоначално зареждане	допълване
<i>Крастни кърлежи</i>	100 мл	100 мл	150 мл
<i>Въшки</i>	25 мл	25 мл	37.5 мл
<i>Мухи, кърлежи</i>	50 мл	50 мл	75 мл

Препоръчителна честота на третирането:

Крастни кърлежи: За лечение - двукратно третиране през 10-дневен интервал. За профилактика – еднократно третиране на всеки 6 месеца.

Въшки: Обикновено едно третиране осигурява защита срещу въшките, в зависимост от степента на опаразитяване.

Кърлежи: Неколкократно третиране, в зависимост от степента на опаразитяване.

Мухи: Еднократното приложение осигурява защита срещу мухите за период от 6 - 8 седмици, в зависимост от степента на опаразитяване, вида на мухите и атмосферните условия.

Специални указания за правилно приложение

За къпане:

1. Зареждане на басейна: Малко количество вода се добавя към необходимото количество Butox 50 и се разпределя по дължината на басейна, като старателно се разбърква преди да се добави останалото количество вода. При преминаване през басейна първите 20 животни разбъркват разтвора, затова е необходимо те да се третират повторно.
2. Допълване на заредения басейн: След третиране на стадото или когато нивото на разтвора намалее с 10% от първоначалното, басейнът трябва се допълни, като се добави необходимото количество вода и Butox 50.
3. Общи инструкции:
Разбъркайте добре преди започване на третирането. Уверете се, че животните не са уморени или жадни преди третирането. Не третирайте животните в много горещо време.

За напръскване:

Малко количество вода се добавя към необходимото количество Vutox 50, след което старателно се разбърква преди да се добави останалото количество вода. Всяко животно трябва да се третира с минимум 3 литра разтвор, като се обръща специално внимание на предпочитаните от паразитите места. При третиране на крастни кърлежи се препоръчва предварително разресване на животните.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Няма.

4.11 Карентни срокове

Месо и вътрешни органи:

Говеда : Нула дни.

Овце: 4 дни.

Мляко:

Говеда: Нула дни.

Овце: Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Противопаразитно средство.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AC11

5.1 Фармакодинамични свойства

Vutox 50 е противопаразитен продукт срещу ектопаразити, чиято активна субстанция (делтаметрин) принадлежи към групата на синтетичните пиретроиди. Неговото действие засяга невротрансмисията на прицелните паразити.

5.2 Фармакокинетични особености

След приложение върху кожата, делтаметринът се абсорбира слабо и остава в контакт с прицелните ектопаразити. Основният път на отделяне от животните е чрез изпражненията.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Aromatic solvent

6.2 Несъвместимости

Не са известни.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

Срок на годност след разтваряне в съответствие с инструкциите: използвайте незабавно.

6.4 Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от светлина.

Да не се съхранява в близост до храни, напитки и фуражи за животни.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Алуминиева бутилка от 1 литър, затворена с винтова полипропиленова капачка и полиетилен-алуминиева спойка от вътрешната страна.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Бутоке 50 не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International B.V
Wim de Koerverstraat 35
5831 AN BOXMEER
The Netherlands

8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 0022-1954-27.02.2013

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 21.02.2008/27.02.2013

10. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 08/2013

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

