

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ, КЪМ ЛИЦЕНЗ
ЗА УПОТРЕБА № 0022-1762-08.05.2012**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Сульфатиазол унгвент

Sulphathiazole unguent

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активни субстанции в 100 g:

Sulphathiazole sodium

5.0 g

Помощни вещества:

За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Унгвент за външно приложение.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Агнета, козлета, телета, овце, кози, крави, коне, кучета.

4.2 Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни

За лечение на инфектирани рани (хемолитични стрептококи, пневмококи, стафилококи, пастъорели и E.coli), както и при други кожни поражения. Действа профилактично при оперативни рани.

Сульфатиазол действа антисептично, притежава антиалергичен и антифлогестичен ефект, спомага за разнасянето на възпалителните продукти, спомага за ограничаването на некротичните тъкани.

4.3 Противопоказания

Няма известни.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Необходимо е преди третирането с продукта некротичните и гнойните участъци на раната предварително да се почистят.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за употреба, включително специални предпазни мерки, които следва да се вземат от лицето, прилагащо продукта върху животните:

Да се спазват условията за асептика и да се избягва пряк контакт с кожата. (да се използват ръкавици при работа с продукта). Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

4.6 Странични реакции (честота и важност)

Не са наблюдавани.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация, тъй като не се резорбира и не се установява в организма.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Продуктът е несъвместим с анестезин, дикаин и прокаин.

Да не се прилага едновременно с други мази.

4.9 Доза и начин на приложение

За външно приложение.

Преди третиране с продукта кожата на заболялия участък да се почиства и застригва. Предварително да се почистят некротичните и гнойните участъци на раната. Продуктът се втрива посредством шпатула внимателно двукратно - сутрин и вечер в продължение на 4-5 дни.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При многократно предозиране не са наблюдавани признаци на непоносимост при видовете животни за които е предназначен продукта.

4.11 Карентен срок

Нула дни.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Дерматологични, Антибиотици и химиотерапевтици, за кожно приложение, Химиотерапевтици за локално приложение, Сулфонамиди.

ATC Vet code: QD06BA02

Сулфонамидите са синтетични съединения, влизащи в групата на противомикробните химиотерапевтични продукти. Те се използват за специфично лечение на някои инфекциозни заболявания. Поради близката си химична структура с парааминобензоената киселина, сулфонамидите се нейни конкурентни антагонисти. Повечето бактерии използват киселината за синтез на фолиевата киселина, която играе важна роля в обмяната и развитието на микроорганизмите.

Сулфонамидите притежават широк антибактериален спектър. Те действат срещу хемолитични стрептококи, пневмококи, стафилококи, пастъорели и E.coli. Слабо активни са срещу много стафилококи, спирохети, ентерококи, клостридия, микоплазма, вируси.

Сулфатаiazолът спада към бързо резорбиращи се и бързо отделящи се сулфонамиди.

Сулфатаiazол натрий с подходящи ексципиенти действа изключително благоприятно при лечение на инфектирани рани (хемолитични стрептококи, пневмококи, стафилококи, пастъорели и E.coli), както и при други кожни поражения.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Cod-liver

Wool Fat

Aqua purificata

White Soft Paraffin

6.2 Несъвместимости

Продуктът е несъвместим с анестезин, дикаин и прокаин.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина

Да се съхранява далече от източници на топлина.

Да се съхранява далеч от храни и напитки.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Пластмасова ламинатна туба, мембрани с уплътняващ пръстен и пластмасова капачка, с размери $\varnothing$ 28/150mm и вместимост 50 g.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

„ФАРМА ВЕТ” ООД, гр. Шумен ул. ”Отец Паисий” № 40, тел/факс 054/ 801-215

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

№ 760/17.05.2007 г.; № 0022-1762-08.05.2012

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

17.05.2007 г.; **08.05.2012**

10. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

12/10/2011

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР