

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ, КЪМ ЛИЦЕНЗ
ЗА УПОТРЕБА № 0022-1871-28.09.2012**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Тетранеокорт спрей

Tetraneocort spray

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активни субстанции в 100 мл:

Oxytetracycline hydrochloride	2.00 g
Neomycin sulfate	0.50 g
Hydrocortisone acetate	0.10 g

Помощни вещества:

За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за кожа.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Говеда, овце, кози, коне, свине и кучета.

4.2 Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни

Тетранеокорт спрей е разтвор с антимикробен, антиалергичен и противовъзпалителен ефект. Той е високо ефективен при лечение на повърхностни случайни и операционни рани, при недълбоки контузни наранявания, при липса на некротични и размачкани тъкани и своевременно направена щателна хирургическа обработка, при интердигиталния дерматит и копитния гнилец.

4.3 Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към тетрациклини и неомицин.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да не се прилага върху вимето на лактиращи продуктивни животни!

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да се пази от попадане по очите. При попадане върху очите същите се измиват обилно с умерена струя вода.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При прилагане на продукта да не се яде, пие или пуши. При работа с *Тетранеокорт спрей* трябва да се използват лични предпазни средства: гумени ръкавици. След работа е необходимо обилно измиване с вода и сапун. Да се пази от попадане по очите. При попадане върху очите същите се измиват обилно с умерена струя вода.

4.6 Странични реакции (честота и важност)

Не са наблюдавани странични реакции от приложението на продукта.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Антибиотиците от тетрациклиновата група вазимодестват с антиациди, калциеви производни /като калциев карбонат/, производни на желязото, магнезий-съдържащи лаксативи, натриев бикарбонат, фенобарбитал, пеницилин, оксацилин, цефалоспорици, ампицилин, карбеницилин, еритромицин, оксацилин.

Хидрокортизоновия ацетат взаимодействат с ампицилин, ефедринев сулфат, хепарин, фено- и пентобарбитал, прометазин хидрохлорид.

4.9 Доза и начин на приложение

Разтвор за приложение върху кожата, чрез напръскване!

Засегнатия участък трябва да се почисти добре от некротични и чужди тъкани, ексудат и други замърсители, след което се напръсква в продължение на 1-2 секунди от разстояние 15-20 cm. Повторно третиране може да се прави на всеки 12 часа до пълно възстановяване на засегнатия участък. Желателно е третираното животно да остане в сухо помещение 24 часа след това.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При многократно предозиране не са наблюдавани признаци на непоносимост при видовете животни, за които е предназначен продукта.

4.11 Карентен срок

Месо и вътрешни органи: Нула дни.

Мляко: Нула дни.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

ATC Vet code: QJ01AA, QJ01GB05, QA07EA

Тетранеокорт спрей е комбинация от два антибиотика и кортизон и е под формата на разтвор. Той е със силен антимикробен, антиалергичен и противовъзпалителен ефект. Оказва благоприятен ефект (от много добър до отличен) при повърхностни случайни и операционни рани, при недълбоки контузни наранявания, при липса на некротични и размачкани тъкани и своевременно направена щателна хирургическа обработка, при интердигиталния дерматит и копитния гнилец.

Активността на продукта се обуславя от неговите активно действащи компоненти.

Окситетрациклинът е широкоспектърен антибиотик (ATC vet classification QJ01A A) с активност главно срещу Грам-положителни и някои Грам-отрицателни бактерии, включително и някои анаероби. Той е активен и срещу хламидии, микоплазми (PPLO), някои протозои, рикетсии, включително *Ehrlichia* и *Haemobartonella*. Спектъра на действие включва още и *Actinobacillus spp.*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *E.coli*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*

Окситетрациклинът възпрепятства развитието на бактерии, микоплазми, хламидии, рикетсии и някои протозои чрез инхибиране синтеза на протеини свързвайки се необратимо с рецепторите на 30S рибозомната субединица, като по този начин се блокира свързването на аминоксил-тРНК към акцепторния сайт на тРНК-рибозомалния комплекс и се възпрепятства добавянето на нови аминокиселини към пептидната верига т.е. нарушава се синтеза на протеини.

Неомицинът е аминогликозиден антибиотик, който действа бактерицидно в логаритмичната и в стационарната фаза на размножаване на микробите. Има среден спектър на действие. Влияе върху Грам-отрицателните и някои Грам-положителни микроорганизми, включително и върху причинителите на бактериални инфекции на гастроинтестиналния тракт – *E. Coli*, *Salmonella spp.*, *Aerobacter aerogenes*, *Shigella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Enterobacter aerogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Cl. perfringens* и др. Механизмът на действие на неомициновият сулфат се изразява в свързване с рибозомите на микроорганизмите и последващо възпрепятстване на точното прикачване на информационната РНК към рибозомите, с което нарушава порядъка на образуване кода на аминокиселините, а с това и синтезата на белтъчини.

Хидрокортизон ацетата повишава синтезата на хиалуроновата киселина и едновременно с това подтиква активността на хиалуронидазата, намалява пропускливостта на капилярите и по този начин проявява своя антиексудативен, антифлогестичен и антиалергичен ефект.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Glycerol
Citric acid monohydrate
Alcohol aethylicus
Aqua purificata

6.2 Несъвместимости

Не са установени.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в оригинална опаковка.
Да се съхранява при температура под 25 °C.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина
Да се съхранява далече от източници на топлина.
Да се съхранява далеч от храни и напитки.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Пластмасови флакони от 200 ml с механична помпа с дюза и предпазна капачка.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

„ФАРМА ВЕТ” ООД, гр. Шумен ул. ”Отец Паисий” № 40, тел/факс 054/ 801-215

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

№ 0022-1871-28.09.2012

9. ДАТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

28.09.2012

10. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

23/08/2012

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР