

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ № 0022-1218**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Timpaveex

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

Dimethylpolysiloxane 3.50 g/100 ml

Експципienti:

За пълния списък на експципientите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Перорална суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Говеда, овце, кози, телета и агнета.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Лечение на тимпания (подуване, метеоризъм, сухо храносмилателно съдържание).

4.3 Противопоказания

Няма.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Не е приложимо.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Може да се наблюдава увеличено отделяне на урина.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Да не се смесва с електролити или течен парафин.

4.9 Доза и начин на приложение

Перорално приложение с бутилка или сонда.

Възрастни говеда: 250 ml TIMPAVEEX/животно.

Овце и кози: 150 ml TIMPAVEEX/животно.

Телета: 150 - 200 ml TIMPAVEEX/животно.

Агнета: 75 - 100 ml TIMPAVEEX/животно.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Няма.

4.11 Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Други ектопаразитициди, вкл. скабициди.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: P03AX05.

5.1 Фармакодинамични свойства

Активната субстанция се използва за контрол на метеоризъм.

Чрез антиферментационното си действие, активната субстанция понижава събирането на газове чрез разпръскване и предотвратяване формирането на мехури обградени от муцин в храносмилателния канал.

5.2 Фармакокинетични особености

Механизмът на действие на активната субстанция се състои в понижаване на повърхностната еластичност на образуваните въздушни мехури при тимпанията, което ги унищожава и предотвратява образуването на нови.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Di (ethylhexyl) – sodium sulfosuccinate

Trietanolamine

Tween

Purified Soybean oil

Sodium metabisulfite

Sodium Propylparaben

Purified water до

100 ml

6.2 Основни несъвместимости

Не са известни.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Непрозрачни бели цилиндрични полиетиленови бутилки с капачка на винт, съдържащи 250 ml, 500 ml и 1 L.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

ФАРМА СИС БГ ООД

Гр. Добрич, ул. „Сан Стефано“ 6 Б, ет.1, офис 3

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-1218

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Дата на първото издаване на разрешението за търговия: 25/08/2009.

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

09/2018

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

