

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА –  
КОМБИНИРАН ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА**

Бутилка от 500 ml, Контейнер от 5 L, Плик от 5 L в кутия

**1. Име и адрес на притежателя на лиценз за употреба и на производителя, отговорен за освобождаване на партидата, ако те са различни**

Притежател на лиценз за употреба:

CHEMICALS LAIF S.P.A.  
Viale dell' Artigianato 13,  
35010 Vigonza (PD), Italy

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

CHEMIFARMA SPA  
Via Don Eugenio Servadei 16,  
47122 Forlì (FC), Italy

**2. Наименование на ветеринарномедицинския продукт**

API-Bioxal 62 mg/ml разтвор за употреба във вътрешността на пчелни кошери  
Oxalic acid dihydrate

**3. Съдържание на активната субстанция и ексципиентите**

Всеки ml съдържа:

**Активна субстанция:**

Oxalic acid dihydrate 62.0 mg  
(еквивалентно на 44.2 mg Oxalic acid)

**Помощни вещества:**

Глицерол  
Вода, пречистена.

**4. Фармацевтична форма**

Разтвор за употреба във вътрешността на пчелни кошери.  
Бистра безцветна светложълта течност.

**5. Размер на опаковката**

500 ml бутилка  
5 L контейнер  
5 L плик в кутия

**6. Терапевтични показания**

Лечение на вароатоза, причинена от *Varroa destructor* при медоносните пчели (*Apis mellifera*).

## 7. Противопоказания

Няма.

## 8. Неблагоприятни реакции

Много често по време на лечението с продукта се наблюдава леко възбуждане. Много често след третиране с продукта може да се наблюдава увеличена смъртност на възрастни пчели.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани пчелни семейства, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 пчелни семейства на 100 третирани пчелни семейства)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 пчелни семейства на 1,000 третирани пчелни семейства)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 пчелни семейства на 10,000 третирани пчелни семейства)
- много редки (по-малко от 1 пчелно семейство на 10,000 третирани пчелни семейства, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

## 9. Видове животни, за които е предназначен ВМП

Медоносни пчели (*Apis mellifera*).

## 10. Дозировка за всеки вид животно, метод и начини на прилагане

За употреба във вътрешността на кошера. Продуктът трябва да се използва както следва:

Дозировка и метод на прилагане чрез накапване:

Необходимата доза е 5 ml на ред (пролука между горните греди на рамките) от пчели. Максималната доза е 50 ml на кошер. До две третириания на година (през зимния и/или пролетно-летния сезон). Лечението трябва да се извърши с едно прилагане. Продуктът трябва да се прилага със спринцовка по дължината на всеки ред пчели.

## 11. Съвет за правилно приложение

Интегрирана програма за управление на вредителите

Ефикасността може да е различна при различните пчелни семейства, поради условията на използване (остатъчно присъствие на пило, температура, повторно заразяване и др.). По тази причина продуктът трябва да се използва като лечение наред с други в рамките на програма за интегрирано управление на вредителите и нивото на опаразитяване с акари трябва да се следи.

## 12. Карентен срок

**Карентен срок:**

Мед: нула дни

Да не се третираат кошерите с поставени магазинни рамки за мед или по време на медосбор.

### 13. Специални условия за съхранение

Да не се охлажда или замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази оригиналната опаковка плътно затворена с цел предпазване от светлина и влага.

Да се съхранява далеч от хранителни продукти.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета след EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

### 14. Специални предупреждения

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

За най-голяма ефикасност този продукт трябва да се използва само, когато няма пило в колонията или количеството му е на най-ниските си нива. Оксаловата киселина не прониква през восъка, така че не може да убие акарите в запечатано пило и по тази причина присъствието на пило може значително да намали ефикасността на продукта. Затова продуктът трябва да се използва през зимата или след манипулация на колонията за генериране на състояние без пило в кошера през лятото (напр. чрез поставяне пчелата-майка в клетка). При третиране през лятото след поставяне на пчелата-майка в клетка, най-високи нива на ефикасност са постигнати при използване на период на престой в клетка от поне 25 дни, в който момент колонииите са били напълно без пило. Сериозно увредените от вароатоза пчелни семейства може да не се повлияят от третирането.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Трябва да се третира, когато в кошера няма магазинни рамки за мед. Всички пчелни семейства в един и същ пчелин трябва да се третират едновременно, за да се избегне повторно заразяване. Избягвайте смущаването на пчелите през дните след третирането.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Продуктът може да е дразнещ за кожата и очите или да причини контактен дерматит. Да се избягва контакт с кожата, очите или лигавиците.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

След прилагане да се измият ръцете и кожата, която влиза в контакт с продукта със сапун и вода. Да се измие старателно всяко облекло, което влиза в контакт с продукта.

При случаен контакт с очите, да се измият добре с големи количества чиста течаща вода и незабавно да се потърси медицински съвет.

При случайно поглъщане, не предизвиквайте повръщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави комбинирания етикет и листовка на продукта.

Да не се яде, пие и пуши, докато се работи с продукта.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се използва едновременно с други акарициди.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

В кошерите, получили тройна доза от продукта чрез накапване, е наблюдавана значително по-висока смъртност на пчелите. В допълнение, при предозиране капацитетът за презимуване на пчелните семейства намалява и може да има вредни ефекти върху развитието им в бъдеще.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

**15. Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.  
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

**16. Датата на последната редакция на текста**

10/2021

**17. Допълнителна информация**

Размер на опаковката:

1 x 500 ml бутилка

**1 x 5 L контейнер**

1x 5 L плик в кутия

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.  
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

**Република България**

Евротом ЕООД

Бул. "Владимир Вазов", № 25, склад № 3

София 1517

+359 2 995 02 80

evrotom@abv.bg

**18. Надписът "Само за ветеринарномедицинска употреба" и условия или ограничения относно разпространението и употребата, ако е приложимо**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**19. Надписът "Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места"**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**20. Срок на годност**

EXP: {месец/година}

След отваряне, използвай в рамките на 12 месеца.

**21. Номер на лиценза за употреба**

**22. Партиден номер**

Lot: {номер}