

**ПРИЛОЖЕНИЕ III**  
**ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА**

## **А. ЕТИКЕТ**

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА**

Кутия, съдържаща 10 ленти в пакет

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

Чекмайт плюс  
CheckMite+

**2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ**

Всяка лента от 13,6 g съдържа: coumaphos 100 mg/g

**3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА**

Лента за пчелен кошер.

**4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА**

10 ленти

**5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Медоносни пчели.

**6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Чекмайт плюс ленти, поставени за срок от 42 дни между питите в отделението с пилото са високо ефективни срещу *Varroa destructor*.

**7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Преди употреба прочети листовката.

**8. КАРЕНТЕН СРОК**

Карентен срок:  
Мед: нула дни.

**9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО**

Да се пази от пряка слънчева светлина.  
Да не се използват повторно употребявани ленти.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се избягва контакт с кожата.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от химически устойчиви ръкавици за еднократно ползване, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Да не се пие, яде или пуши, докато се работи с продукта.

Да се съхранява далеч от храна, фураж и вода за пиене.

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се измиват ръцете след работа с продукта.

Този продукт съдържа органофосфати. При симптоми на отравяне да се потърси медицински съвет.

Антидот: при отравяне да се инжектира интрамускулно атропин сулфат 1% разтвор. Доза (човек): 0,2 - 0,5 ml.

Да се повтори инжектирането с атропин сулфат, когато действието на атропина намалее и симптомите на отравяне (свити зеници, треперене, повръщане, диария) се влошат.

#### **10. СРОК НА ГОДНОСТ**

Годен до {месец/година}

#### **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

#### **12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Унищожаване: прочети листовката.

#### **13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО**

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпусна само по лекарско предписание.

#### **14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

#### **15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Германия

#### **16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП**

0022-1832-19.07.2012

**17. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Партида {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ  
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Пакет за 10 ленти

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

CheckMite +  
Coumafos

**2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**



**3. СРОК НА ГОДНОСТ**

EXP {месец/година}

**4. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**В. ЛИСТОВКА**

## ЛИСТОВКА:

Чекмайт плюс, ленти за пчелни кошери

### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Германия

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

KVP, Pharma + Veterinär-Produkte GmbH, Kiel, (Германия)

### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

Чекмайт плюс

Coumafos

### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ**

**Активна субстанция:**

Coumaphos 100 mg/g

### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Чекмайт плюс ленти, поставени за срок от 42 дни между питите в отделението с пилото са високо ефективни срещу *Varroa destructor*.

### **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се използва при отглеждане на пчела майка.

### **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

Отглеждането и производството на пчела майка се нарушават от лечението на колонията с Чекмайт плюс.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

### **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**


Медоносни пчели.

### **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**



Начин на приложение: в пчелни кошери.

Да се използват две Чекмайт плюс ленти за пчели за всяко пчелно семейство. Провесете лентите между две пити в отделението с пилото за срок от 42 дни.



## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Третирайте всички заразени семейства в рамките на пчелина. Най-ефективен контрол може да се осъществи, като се третират кошерите през пролетта преди началото на медосбора или през есента след последния медосбор. Данните показват, че използването през медосбора не води до превишаване на максимално допустимите стойности остатъчни количества *coumaphos* в стоковия мед.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Мед: нула дни.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температурни условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху пакета и кутията след EXP.

Алуминиевият пакет да се съхранява в картонената кутия.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: след отваряне на пакета, да се използват всички ленти.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да не се използва при отглеждане на пчела майка.

Всички семейства в пчелина трябва да бъдат третирани едновременно.

Продуктът трябва да се използва като част от цялостна програма за контрол на вароатозата. Наред с другите мерки, програмата трябва да включва редуване на продукти и системно наблюдение на степента на опаразитяване с акари през годината.

Като ефективен метод за намаляване на риска от развитие на резистентност, трябва да се прилага редуване с продукти, съдържащи активни субстанции от други химични класове.

Неправилната употреба на продукта може да повиши риска от развитие на резистентност и да доведе до неефективно лечение и загуба на семейства.

Пчелните семейства трябва да бъдат рутинно наблюдавани с цел установяване степента на опаразитяване с акари (*Varroa*) (напр. чрез установени стандартни тестове като постоянен мониторинг на естествено падналите акари чрез лепкави подложки, или изследване степента на опаразитеност на 100 пчели).

Чекмайт плюс не трябва да се използва при съществуваща резистентност към *coumaphos*.

#### Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

За употреба само в пчелни кошери.

Да не се превишава препоръчителното време за прилагане от 42 дни.

Може да се развие паразитна резистентност към всеки клас акарициди. За да се намали риска от селекция на резистентни вароа кърлежи в третираните пчелни популации, е препоръчително да се избягва многократно прилагане на Чекмайт и да се редува с продукт, съдържащ активна субстанция от друг химичен клас.

Да не се използват повторно употребявани ленти.

Употребата на продукта в несъответствие с инструкциите, посочени в листовката, може да повиши разпространението на резистентни вароа щамове.

Тъй като резистентни вароа кърлежи могат да станат отново чувствителни към *coumaphos*, особено след използване на продукти, съдържащи активни субстанции от други химични класове, трябва да се обмисли повторно тестване.

#### Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се избягва контакт с кожата.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от химически устойчиви ръкавици за еднократно ползване, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Да не се пие, яде или пуши, докато се работи с продукта.

Да се съхранява далеч от храна, фураж и вода за пиене.

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се измиват ръцете след работа с продукта.

Този продукт съдържа органофосфати. При симптоми на отравяне да се потърси медицински съвет.

Антидот: при отравяне да се инжектира интрамускулно атропин сулфат 1% разтвор. Доза (човек): 0,2 - 0,5 ml.

Да се повтори инжектирането с атропин сулфат, когато действието на атропина намалее и симптомите на отравяне (свити зеници, треперене, повръщане, диария) се влошат.

#### Заплодяемост:

Отглеждането и производството на пчела майка се нарушават от лечението на колонията с Чекмайт плюс.

#### Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При двойна доза (четири ленти Чекмайт плюс за пчелно семейство), смъртността на пчелите работнички и здравословното състояние на пчелното семейство не се различават значително от тези на семейства, при които са приложени 2 ленти. Значителен токсичен ефект и повишена смъртност може да настъпи при четирикратно предозиране (осем Чекмайт плюс ленти за пчели на семейство).

#### Други предпазни мерки:

Активната субстанция *coumaphos* е силно токсична за водни организми и птици.

Да не се замърсяват реки, водохранилища, водоизточници, язовири и други водни обекти.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.  
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.  
Чекмайт плюс не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми.

**14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

01/2021

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.