

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ  
КЪМ ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА № 0022-1676**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

APIGUARD gel

Апигард гел

Съдържание на тимол: 12.5 g / 50.0 g ± 5 %

**2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

**Активна субстанция:**

Thymol 12.500 g / 50.0 g гел

**Екципienti:**

Carbomer 0.1875.g

Triethanolamine 0.1875 g

Purified Water 37.1250 g

За пълния списък на ексципientите, виж т. 6.1.

**3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА**

Гел.

**4. КЛИНИЧНИ ДАННИ**

**4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП**

Апигард гел е предназначен за приложение при пчелни семейства.

**4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни**

За лечение и профилактика на вароатозата по пчелните семейства.

**4.3 Противопоказания**

Няма.

**4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП**

Да се спазва разрешената схема на дозиране, неправилното дозиране може да се отрази неблагоприятно на пчелната колония.

**4.5 Специални предпазни мерки при употреба**

Да не се прилага по време на медосбора.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Третирането може да бъде започнато непосредствено след сваляне на магазините.

Да не се прилага в случаите, при които максималната дневна температура не надвишава 15 °С, когато активността на пчелното семейство е ниска или когато температурата е над 40 °С.

Комбинируйте слабые пчелные семейства перед третирующей.  
Все колонии на пчелу должны лечиться одновременно.

#### Специальные защитные меры для людей, прилагающие ветеринарно-медицинский препарат для животных

Избегайте контакта с кожей и глазами.

Не вдыхайте напрямую.

Индивидуально защитное оборудование должно использоваться, когда вы работаете с ветеринарно-медицинским препаратом.

После приложения, смойте руки с мылом и водой и оборудование, которое было в контакте с гелем.

При случайном контакте с кожей или глазами, смойте осторожно затронутые поверхности водой.

При случайном инциденте, немедленно обратитесь за медицинской помощью, к врачу вы предоставите инструкцию или этикетку на препарат.

#### **4.6 Неблагоприятные реакции (частота и важность)**

Забеляются некоторые изменения в поведении пчелиной семьи.

Иногда при высоких температурах может наблюдаться слабое снижение активности молодых пчел при третирующей, это временно и не оказывает влияния на развитие колонии.

#### **4.7 Использование во время беременности, лактации или яйцекладки**

Не применяется.

#### **4.8 Взаимодействие с другими ветеринарно-медицинскими препаратами и другими формами взаимодействия**

Нет доступных данных.

#### **4.9 Доза и способ применения**

Приложение в улье: Апигард гель, при нормально развитых пчелиных семьях, применяется два раза по одной упаковке от 50 г через интервал в две недели.

Максимум две третирующие в год.

#### **Способ применения:**

Откройте улей. Отклейте наклейку (фольгу) на препарате, оставив часть фольги приклеенной к одному краю улья. Поставьте открытый улей в центре улья, с открытой частью (гелем) вверх.

Уверены, что есть достаточно места – 0,5 см между верхней частью улья и крышкой улья. Закройте улей. После двух недель поставьте новую улейку на место старой, согласно инструкции. Извлеките препарат, когда улейка будет открыта. Извлеките препарат, когда снимаете улейку.

Эффективность Апигард геля максимальна, если препарат используется в конце лета, после завершения медосбора, (когда активность пчел минимальна). Препарат может использоваться и в течение лета (при температуре выше 15 °С), когда наблюдается высокий уровень паразитирования.

#### **4.10 Предостережение (симптомы, экстренные меры, антитоксины), если необходимо**

В случае использования доз, превышающих рекомендуемые (50 г на приложение), могут появиться изменения в поведении пчелиной семьи (возбуждение, выход из улья). Если наблюдаются описанные симптомы, извлеките из улья избыточное количество препарата.

#### **4.11 Карантинный срок**

Мед: 0 дней.

Да не се прилага по време на медосбора.

## **5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ**

Фармакотерапевтична група: ектопаразитицид за локална употреба, съдържащ инсектициди.  
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AX22

### **5.1 Фармакодинамични свойства**

Тимолът притежава акарицидно действие. Досега точният механизъм на действие не е напълно изяснен. Той действа директно върху акарите контактно и чрез инхалация. Денатурирането на белтъците е един от възможните начини на действие върху акарите.

### **5.2 Фармакокинетични особености**

Апигард гел е продукт, който осигурява забавено освобождаване на активната субстанция тимол за период от две седмици.

2/3 от действието на тимола е чрез инхалация и 1/3 е контактното.

Начинът на действие варира в зависимост от температурата и активността на пчелите.

### **Влияние върху околната среда**

Продуктът не представлява опасност за околната среда.

## **6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ**

### **6.1 Списък на ексципиентите**

Carbomer  
Triethanolamine  
Purified Water

### **6.2 Основни несъвместимости**

Не е приложимо.

### **6.3 Срок на годност**

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

### **6.4 Специални условия за съхранение на продукта**

Да не се съхранява при температура над 30 °C.

Да не се замразява.

Да се съхранява неотворен в оригинална опаковка.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Продукта да не се съхранява близо до пестициди или други химически субстанции, които могат да го контаминират.

Да се съхранява далеч от храни.

### **6.5 Вид и състав на първичната опаковка**

Алуминиева тавичка  
Алуминиев капак

Търговска опаковка:

Кутия съдържаща 10 тавички по 50 g гел.

**6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него**

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

**7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

Vita Bee Health Limited  
1 Castlewood Avenue  
Rathmines, Dublin 6.  
D06 H685  
Ireland

**8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

0022-1676-16.12.2011

**9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 24.07.2006

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 16.12.2011

**10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

04.2019

**ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА**

Не е приложимо.



**Д-Р ЦВЯТКО АЛЕКСАНДРОВ, ДВМ**  
**ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**