

А. ЕТИКЕТ**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА**

Пликчета от екструдирана хартия по 50 g

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

СУЛФАГВАНИДИН прах

SULFAGUANIDIN pulvis

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

Активна субстанция:

Sulfaguanidine 50.00 g/50 g

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Перорален прах.

РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 g.

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кончета, телета, прасета, агнета, ярета и птици.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на бактериални чревни инфекции – колит и ентерит, протичащи с диария; гастроентерити при млади и подрастващи животни; при диспепсия при телета и пилета; колибацилоза при телета и прасета; кокцидиоза при пилета.

Преди употреба прочети листовката.

7. МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Доза:

Средна лечебна доза: 0.1- 0.3 g/kg т.м. за денонощие;

за телета и кончета: от 5.0 - 10.0 g дневно;

за прасета: 0.5 - 1.0 g дневно;

за агнета и ярета: 0.5 - 1.0 g дневно;

за птици: 0.4 – 0.6 g дневно на птица, разделено на 2 приема или 5 g/kg концентриран фураж.

Обикновено на всеки 2 следващи дни дозата се намалява с $\frac{1}{4}$ от първоначалната.

Начин на приложение:

Перорално – самостоятелно или стрит в концентрирания фураж. Третирането се извършва 3 пъти дневно. Курсът на лечение продължава 6 до 7 дни.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: 12 дни.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне, използвайте преди.....

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

ВЕТПРОМ АД
ул. „Отец Паисий” №26
2400 гр. Радомир,
България

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

№ 0022-1417

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

ЛИСТОВКА:
СУЛФАГВАНИДИН прах
SULFAGUANIDIN pulvis

За кончета, телета, прасета, агнета, ярета и птици.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД
ул. „Отец Паисий” №26,
2400 гр. Радомир,
България

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

СУЛФАГВАНИДИН прах

SULFAGUANIDIN pulvis

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:

Sulfaguanidine 50.00 g / 50g

Ексципиенти:

Няма.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на бактериални чревни инфекции – колит и ентерит, протичащи с диария; гастроентерити при млади и подрастващи животни; при диспепсия при телета и пилета; колибацилоза при телета и прасета; кокцидиоза при пилета.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва по-дълго от 10 дни при младите животни и при хиповитаминоза В и К.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.

Да не се използва при животни в състояние на дехидратация или констипация.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Възможните неблагоприятни реакции са:

- кристалурия;
- хиповитаминоза В и К;
- прояви на свръхчувствителност към активната субстанция на ветеринарномедицинския продукт (обриви, дерматити);
- диария.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кончета, телета, прасета, агнета, ярета и птици.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Доза:

Средна лечебна доза: 0.1- 0.3 g/kg т.м. за денонощие;

за телета и кончета: от 5.0 - 10.0 g дневно;

за прасета: 0.5 - 1.0 g дневно;

за агнета и ярета: 0.5 - 1.0 g дневно;

за птици: 0.4 – 0.6 g дневно на птица, разделено на 2 приема или 5 g/kg концентриран фураж.

Обикновено на всеки 2 следващи дни дозата се намалява с $\frac{1}{4}$ от първоначалната.

Начин на приложение:

Перорално – самостоятелно или стрит в концентрирания фураж. Третирането се извършва 3 пъти дневно. Курсът на лечение продължава 6 до 7 дни.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте СУЛФАГВАНИДИН прах съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: 12 дни.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина..

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Продуктът се прилага само за ветеринарномедицинска употреба от ветеринарни лекари.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
Не е приложимо.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Яйценосене:

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за консумация от хора.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Остра интоксикация при предозиране с ветеринарномедицински продукти, съдържащи в състава си сулфонамиди, при животни се наблюдава много рядко. Освен посочените в т.4.6 неблагоприятни реакции, при приложение на високи дози от тези продукти има случаи на стимулиране на ЦНС и дегенерация на миелина.

Мерки при предозиране:

При кристалурия като антидот се прилага натриев бикарбонат за алкализиране на урината.

При хиповитаминоза В и К като антидот се прилагат бирена мая или хлебна мая, дрождиран фураж и др.

Основни несъвместимости:

Сулфонамидите могат да изместят другите външно свързващи се с протеините продукти, като фенилбутазон, тиазидни диуретици, салицилати и др.

Съвместното перорално приложение на ветеринарномедицински продукти с антиацидно действие със сулфонамиди, може да доведе до намаляване на бионаличността на сулфонамидите.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

11/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Д-Р ИВАН ШИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР